

Орнитоз (хламидиоз) птиц
(информационная памятка для населения)

Орнитоз – заразная болезнь птиц, вызываемая Хламидофилой пситтаци. Птицы не только болеют орнитозом, но и могут быть бессимптомными носителями этой инфекции, т.е. инфицированными возбудителем орнитоза.

Эффективные средства профилактики орнитоза птиц отсутствуют, лечение не всегда дает результативный эффект.

Опасность орнитоза птиц заключается в том, что орнитозом от больных и инфицированных птиц может заразиться человек.

Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Заражение может произойти контактным путем через поврежденные кожные покровы и слизистые (ранение, поклевывание), а также алиментарным путем (попадание возбудителя в организм с загрязненными продуктами питания).

Больные и подозрительные по заболеванию птицы подлежат убою бескровным методом. Остальным птицам назначают лечение антибиотиками тетрациклинового ряда в течение 10 - 14 дней (доза тетрациклина 40 мг на 1 кг живой массы в сутки). В помещении, где содержались больные и подозрительные по заболеванию орнитозом птицы, проводится тщательная механическая очистка и дезинфекция.

Лица, ухаживающие за неблагополучными по заболеванию орнитозом птицами, должны быть обеспечены обычной спецодеждой, защитными очками и ватно-марлевыми масками. За этими лицами устанавливается постоянное медицинское наблюдение.

Подстилка с пометом больных и подозрительных по заболеванию орнитозом птиц заливается дезраствором и обрабатывается в соответствии с инструкцией по применению этого дезраствора.

При выявлении изменений состояния птиц владельцу необходимо обращаться к ветеринарному врачу с целью профилактики заразных болезней птиц и проведения профилактических исследований на эти болезни.

ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению орнитоза птиц приводят несанкционированные перевозки партий птиц, а также приобретение птиц без ветеринарных сопроводительных документов.

ПОМНИТЕ, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов орнитоза и его распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!

Орнитоз (хламидиоз) птиц

(информационная памятка для продавцов птиц)

Орнитоз – заразная болезнь птиц, вызываемая Хламидофилой пситтаци. Птицы не только болеют орнитозом, но и могут быть бессимптомными носителями этой инфекции, т.е. инфицированными возбудителем орнитоза.

Эффективные средства профилактики орнитоза птиц отсутствуют, лечение не всегда дает результативный эффект.

Опасность орнитоза птиц заключается в том, что орнитозом от больных и инфицированных птиц может заразиться человек.

Заражение человека в основном происходит воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем. Заражение может произойти контактным путем через поврежденные кожные покровы и слизистые (ранение, поклевывание), а также алиментарным путем (попадание возбудителя в организм с загрязненными продуктами питания).

В случае возникновения заболевания орнитозом в птицеводческих хозяйствах, зообазах вводятся ограничительные мероприятия.

По условиям ограничений:

- запрещается вывод (продажа) и ввод (ввоз) в хозяйство новых птиц, а также перегруппировка их внутри хозяйства
- запрещается сбор и закладка яиц на инкубацию из птичников, в которых протекает заболевание.

Больную и подозрительную по заболеванию птицу выбраковывают из общего стада и убивают бескровным методом. Остальной птице назначают лечение антибиотиками тетрациклинового ряда в течение 10 - 14 дней (доза тетрациклина 40 мг на 1 кг живой массы в сутки).

В хозяйстве проводится тщательная механическая очистка и дезинфекция в присутствии птицы.

Для ухода за птицей назначают постоянный обслуживающий персонал. Посещение этими лицами других производственных помещений не допускается. Лица, обслуживающие неблагополучную по заболеванию орнитозом птицу, должны быть обеспечены обычной спецодеждой, защитными очками и ватно-марлевыми масками. За этими лицами устанавливается постоянное медицинское наблюдение.

В период действия ограничений подстилку с пометом птиц заливают дезраствором и обрабатывают в соответствии с инструкцией по применению этого дезраствора.

Ограничения с хозяйства (предприятия) снимают через 30 дней после последнего случая выявления больной или подозрительной по заболеванию птицы и проведения заключительных ветеринарно-санитарных мероприятий.

Возникновение очагов орнитоза птиц в хозяйствах и зообазах неизбежно влечет за собой экономические потери.

ЗНАЙТЕ! Наиболее часто к появлению орнитоза птиц приводят несанкционированные перевозки партий птиц, а также приобретение птиц без ветеринарных сопроводительных документов.

ПОМНИТЕ, за действия (бездействия), повлекшие за собой возникновение очагов орнитоза и его распространение предусмотрена административная и уголовная ответственность!